



# Clamidia en Carolina del Norte, 2021



## Las tasas notificadas de infecciones por clamidia se mantuvieron altas en 2021


### Carolina del Norte, 2021:

- 65.107 casos notificados entre hombres y mujeres (tasa de 617,1 casos por 100.000).


### Estados Unidos, 2021:

- 1.628.397 millones de casos notificados entre hombres y mujeres (tasa de 490,6 casos por 100.000) (<https://www.cdc.gov/std/statistics/2021/default.htm>).

**Tendencias de la clamidia:** Las tasas de clamidia son relativamente estables.



### El número reportado de infecciones de clamidia disminuyó durante el brote inicial de COVID-19.




### Es probable que varios factores hayan contribuido a la disminución de los casos notificados:

- Disminución en la disponibilidad de pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual a través de clínicas públicas y privadas durante el apogee de la pandemia de COVID-19.
- Suministros y reactivos de prueba limitados.
- La orden de quedarse en casa para reducir la propagación de COVID-19 también puede haber disminuido los comportamientos sexuales.

### Tratamiento Tardío para la Clamidia (2020)

- El retraso en comenzar a recibir tratamiento para la clamidia (<7 días desde el diagnóstico) pueden provocar un aumento de la morbilidad y la transmisión.
- Las mujeres fueron más propensas que los hombres a recibir un tratamiento tardío.
- Las diferencias entre raza, etnia y grupos de edad fueron mínimas.



\*Los datos de 2020 deben tratarse con precaución debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en el acceso a las pruebas de ITS, el tratamiento de ITS y las actividades de vigilancia en Carolina del Norte. Abreviaturas: IA: Indo Americano, NA: Nativo de Alaska, Afroam: Afroamericano, NH: Nativo de Hawái, IP: Isleño del Pacífico, Múl: Multiracial, Hisp: Hispano, Adol: Adolescente.



# Clamidia en Carolina del Norte, 2021



## ¿Qué está haciendo Carolina del Norte para disminuir la clamidia?

- En septiembre de 2014, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (SLPH, por sus siglas en inglés) aumentó el límite de edad superior para la detección de clamidia de rutina en mujeres de 24 años (según lo recomendado por los CDC) a 25 años.
- Carolina del Norte proporciona fondos para la detección de clamidia para todas las mujeres que son atendidas en un centro de atención médica financiado con fondos públicos, como los departamentos de salud locales y los entornos de planificación familiar.
- Carolina del Norte apoya la terapia de pareja acelerada para la clamidia; esta terapia puede ayudar a asegurar que las parejas reciban tratamiento, previniendo la reinfección. Se pueden encontrar recursos y protocolos: <https://www.cdc.gov/std/products/infographics/images/EPT-Infographic2016-800.jpg>.

## ¿Cómo se trata la clamidia y por qué hacemos un seguimiento del tratamiento?

# 82%

De las personas con clamidia tuvieron un tratamiento correcto registrado en 2021.

- La clamidia se puede tratar con antibióticos: doxiciclina, azitromicina y levofloxacina, o durante el embarazo se recomiendan azitromicina y amoxicilina. Para obtener más información, consulta las [Pautas de Tratamiento de los CDC](#).
- La clamidia cuando no es tratada o no es tratada correctamente puede resultar en resultados de salud graves, incluido un mayor riesgo de VIH, EIP e infertilidad.
- La clamidia puede transmitirse de madre a hijo durante el parto, lo que provoca infecciones oculares y pulmonares graves en el recién nacido. El tratamiento de los bebés al nacer puede proteger a los bebés. En 2021, nacieron 11 bebés de madres infectadas con clamidia.

- Para el 15% de las personas con clamidia, no se disponía de información sobre el tratamiento; estas personas pueden no haber sido tratadas.
- Al menos el 3% de las personas con clamidia recibieron un tratamiento incorrecto. Los medicamentos incorrectos utilizados con mayor frecuencia fueron: Ceftriaxona (Rocephin), Amoxicilina/Clavulanato (Augmentin) y Metronidazol (Flagyl).

## Lo que pueden hacer los CLÍNICOS

- Pregunta rutinariamente a los pacientes sobre su actividad sexual y evalúa a aquellos que son sexualmente activos
- Trata a todas las mujeres embarazadas diagnosticadas con clamidia de manera rápida y correcta, siguiendo las Pautas para el Tratamiento de las ITS de los CDC ([Resumen de las Pautas para el Tratamiento de las ITS de los CDC de 2021](#)).
- Remite a las parejas para recibir tratamiento y considera implementar la terapia acelerada para parejas (EPT, por sus siglas en inglés).
- Tanto el paciente como su pareja deben recibir tratamiento para curar y prevenir la reinfección.
- Para obtener otros recursos, visita el compendio de la Coalición Nacional para la Salud Sexual ([Compendio de Recursos de Salud Sexual y Reproductiva para Proveedores de Atención Médica](#)).

## Lo que PUEDES hacer

**Si tiene clamidia, asegúrate de que tu y tus parejas reciban tratamiento y vuelvan a hacerse la prueba después de tres meses.**

**Notifique de forma anónima a sus parejas a través de [TellYourPartner.org](http://TellYourPartner.org)**

Fuentes de Datos: Sistema Electrónico de Vigilancia de Enfermedades de Carolina del Norte (NC EDSS, por sus siglas en inglés) (datos al 7 de septiembre de 2022).