



Las tasas de infecciones por clamidia se mantuvieron elevadas en 2023


Carolina del Norte 2023:

- 65,906 casos reportados entre hombres y mujeres (tasa de 616.0 casos por 100,000).

Estados Unidos, 2023:


- 1,648,568 millones de casos reportados entre hombres y mujeres (tasa de 492.2 casos por 100,000)

(<https://www.cdc.gov/sti-statistics/annual/summary.html>).



Tendencias de la clamidia: Las tasas de clamidia son relativamente estables.


Las personas que viven en zonas empobrecidas suelen tener menos acceso a recursos, incluidos los recursos para la salud. Esto puede dificultar el acceso a la atención médica y aumentar las posibilidades de transmisión de enfermedades.



La mayoría de las personas con clamidia no se identificaban como hispanas; sin embargo, la clamidia entre las personas hispanas y latinas aumentó más rápidamente desde el 2019 (aumento del 61%) en comparación con las personas no hispanas/LatinX (aumento del 5%).

Retraso en el tratamiento de la clamidia (2023)

- Los retrasos en el tratamiento de la clamidia (>7 días desde el diagnóstico) pueden aumentar la morbilidad y la transmisión.
- Las mujeres fueron más propensas que los hombres a recibir tratamiento tardío.
- Las diferencias entre raza, etnia y grupos de edad fueron mínimas.



*Los datos de 2020 deben tratarse con precaución debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en el acceso a las pruebas de ITS, el tratamiento de ITS y las actividades de vigilancia en Carolina del Norte. Abreviaturas: IE: Indígena Estadounidense, NA: Nativo de Alaska, Afro-Am: Afroamericano, NH: Nativo de Hawai, IP: Isleño del Pacífico, Multi: Multirracial, Hisp: Hispano, No-Hisp: no hispano.



¿Qué está haciendo Carolina del Norte para reducir la clamidia?

- En septiembre de 2014, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (SLPH, por sus siglas en inglés) aumentó el límite superior de edad para el examen rutinario de clamidia en mujeres de 24 años (como recomiendan los CDC), a 25 años.
- Carolina del Norte proporciona fondos para la detección de la clamidia a todas las mujeres atendidas en un centro médico financiado con fondos públicos, como los departamentos de salud locales y los centros de planificación familiar.
- Carolina del Norte apoya la terapia acelerada de la pareja para la clamidia; esta terapia puede ayudar a asegurar que las parejas reciban tratamiento, evitando la reinfección. Puede encontrar recursos y protocolos en: <https://www.cdc.gov/std/products/infographics/images/EPT-Infographic2016-800.jpg> (en inglés).

¿Cómo se trata la clamidia y por qué hacemos un seguimiento del tratamiento?

90%
De las personas
con clamidia
recibieron el
tratamiento
correcto en 2022

- La clamidia puede tratarse con antibióticos: doxiciclina, azitromicina y levofloxacino, o durante el embarazo se recomienda azitromicina y amoxicilina. Para más información, consulta las [Pautas de tratamiento de los CDC](#) (en inglés).
- La clamidia no tratada o tratada incorrectamente puede tener consecuencias graves para la salud, como un mayor riesgo de VIH, enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) e infertilidad.
- La clamidia puede transmitirse de la madre al bebé durante el parto, provocando graves infecciones oculares y pulmonares en el recién nacido. El tratamiento de los bebés al nacer puede proteger a los recién nacidos. En 2023, 7 de los recién nacidos fueron diagnosticados con clamidia, y presuntamente estuvieron expuestos durante su parto.

- Para el 7% de las personas con clamidia, no se disponía de información sobre el tratamiento; es posible que estas personas no hayan recibido tratamiento.

Qué pueden hacer los MÉDICOS

- Remitir a las parejas para que reciban tratamiento y considerar la posibilidad de aplicar la Terapia de Pareja Acelerada (TPA).
- Tanto el paciente como su pareja deben ser tratados para curar y prevenir la reinfección.
- Para otros recursos, visita el compendio de la Coalición Nacional para la Salud Sexual: Compendio de recursos de salud sexual y reproductiva para profesionales de la salud ([Compendium of Sexual & Reproductive Health Resources for Healthcare Providers](#), en inglés).

Qué puedes hacer TÚ

Si tienes clamidia, asegúrate de que tanto tú como tus parejas reciban tratamiento y vuelvan a hacerse la prueba después de tres meses.

Avisa de forma anónima a tus parejas a través de tellyourpartner.org/es/



Fuente de datos: Sistema electrónico de vigilancia de enfermedades de Carolina del Norte (NC EDSS, por sus siglas en inglés) (Datos hasta el 1 de julio de 2024).